SMILE CLINIC
МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА

Рекомендации после имплантации

После имплантации:

- Сразу после операции в течение 3-4 ч. показаны холодные компрессы – на 10-15 мин. с интервалом в 20-30 мин.
- Не кушать на протяжении первых 2-3 ч.
- По истечении 3 часов поесть мягкую, теплую еду (йогурт, суп-пюре).
- В течение 3 суток запрещены холодные, горячие напитки, кислые, острые блюда.
- Жевать необходимо с той стороны, где не было хирургического вмешательства.
- Если вы курите, полностью отказаться от курения на 3 дня, не употреблять алкоголь.
- Избегать физических нагрузок, а также посещения бань, саун, бассейна в течение 1 месяца.
- В течение первых 3-4 суток следует ограничиться проведением ротовых ванночек (просто удерживать раствор в полости рта), после чего можно проводить осторожные полоскания.
- На 3-5 сутки, то есть после уменьшения воспалительного процесса и отеков, необходимо начинать пользоваться зубной щеткой. Обязательно купите новую зубную щетку.

Для заметок

smlclinic.ru

8 (843) **205-05-05**

ул. Вербная, 1
ул. Бондаренко, 8а
ул. Академика Лаврентьева, 11
ул. Галимджана Баруди, 16

В каких случаях обратиться к врачу:

- Боль не проходит или усиливается спустя 3 дня после операции.
- Онемение сохраняется на 2 день после операции, не проходит спустя неделю после имплантации и только усиливается, распространяется по всему лицу.
- Резкое увеличение отека лица на 2-3 день или после того, как он уже спал.
- Резкое повышение температуры тела.
- Возникают неприятные ощущения при надавливании на имплант, резкая боль, разошлись швы.
- Покраснение десны и кровотечение, которое не останавливается спустя 2-3 часа.
- Боль после фиксации протеза, зубы не смыкаются, невозможно жевать даже мягкую пищу.
- Протез стал подвижным, произошел скол части зубов.

В нашей сети предоставляется пожизненная гарантия на имплантаты. Мы берем на себя обязательство при обнаружении дефекта, конструктивных неточностей заменить аналог корня на новый (имплантат).

Отмена гарантийного срока:

- **протезирование на импланте в другой стоматологической клинике;**
- посещение после имплантации другой стоматологической клиники в лечебных целях (в зоне установки искусственного корня);
- пропуск профилактических визитов в клинику;
- игнорирование ежегодной профессиональной чистки зубов, в т.ч. искусственных (не реже 1 раза в 6 мес.);
- получение травмы, из-за чего необходима замена стержня;
- скрытие наличия хронических заболеваний перед операцией, из-за чего возникли осложнения (отторжение импланта);
- не соблюдение рекомендаций врача после операции: плохая забота о гигиене ротовой полости, пренебрежение приемом назначенных врачом медикаментов, употребление алкоголя, полеты на самолете, посещение сауны или бани и др.;
- курение.